

Nakažených klíšťovou encefalitidou je už 65. Za měsíc jich je čtyřnásobek

Idnes.cz, 18. 6. 2019

Klíšťovou encefalitidou se letos v Česku nakazilo zatím 65 lidí. O měsíc dřív přitom Státní zdravotní ústav registroval jen 15 nemocných. Výskyt nemoci se každoročně zhoršuje s oteplováním se počasím a vrcholí o letních prázdninách. Počty nakažených jsou aktuální k 11. červnu.

Do loňského června bylo nemocných 138, za celý rok 712. Letos ale sezona začala dříve. Od ledna do dubna byl počet nemocných podle vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jana Kynčla nejvyšší za posledních deset let.

Za tři roky se počet nakažených v Česku zdvojnásobil. V roce 2015 jich bylo 251, loni už 712. Prevencí nemoci je očkování. Zatímco své děti nechávají rodiče očkovat poměrně často, sami se nechraňují.

„Podobně jako u chřipky jsou mnozí přesvědčeni, že se jich klíšťová encefalitida netýká, což je velký omyl. Řada lidí také velmi podceňuje závažnost klíšťové encefalitidy, která se již vyskytuje prakticky na celém území Česka,“ dodal Kynčl.

Podle odborníků také mnozí nepřijdou na přeočkování, které prodlouží účinnost vakcíny po třech či pěti letech. „Už na první přeočkování z nich dorazí pouze čtvrtina naočkovaných. Tři nebo pět let je relativně dlouhá doba, lidé na přeočkování zapomenou, někdo ani neví, že je přeočkování nutné,“ doplnil vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Při novém zahájení očkování je třeba znovu aplikovat tři dávky.

Pojišťovny na vakcínu přispívají

V Česku není vakcína hrazená z veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovny na něj ale přispívají až 1 500 korun za rok. Jedna vakcína stojí asi 1 500 korun, k vybudování ochrany jsou třeba dvě dávky v odstupu 14 dní až tří měsíců, další pak do roka. Potom následuje pravidelné přeočkování.

Klíšťata přenášejí dvě nebezpečná onemocnění. Lymeská borelióza se léčí pomocí antibiotik, proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí přisátí trávající dvě hodiny.

Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Pokud nemocní dodržují klidový režim, nemoc většinou ustoupí do dvou až sedmi dní. Jinak může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan.

Sledujte své klíště. Čím je nacucanější, tím je nebezpečnější

Nemocní s boreliózou jsou unavení a mají zvýšenou teplotu. Typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed, objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou být postiženy klouby, centrální nervový

system a někdy také srdce. Ochrana před boreliózou, bakteriálním onemocněním, zatím neexistuje, dá se ale léčit.

Klíšťová encefalitida se nevyskytuje ve Španělsku, na většině území Francie, v jižní Itálii a v další oblastech, kde je velkou část roku velmi sucho a horko. Na jihu Evropy žije jiný druh klíštěte, podle SZÚ se objevilo už i v Německu a Rakousku. „Klíště Hyalomma se vyskytuje v zemích Středomoří, kam běžně jezdíme na dovolené, včetně Chorvatska, Bulharska nebo Turecka,“ uvedl Maďar. Tento druh klíštěte přenáší především rickettsie, což jsou bakterie pronikající do buněk. Způsobují horečnaté stavy podobné chřipce.

Klíšťová encefalitida v Česku Rok Počet nakažených 2019 65 (k 11. červnu) 2018 712 2017 687 2016 565 2015 351 2014 410 2013 625 2012 573 2011 861 2010 589 2009 816 2008 631 2007 546 2006 1029

Zdroj:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klistova-encefalitida-cesko-pocet-nakazenych-nemoc-65-lidi.A190618_165027_domaci_chnl